

کد کنترل

209

E



209E

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۹

رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک - کد (۲۷۰۳)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک - اصول معاینه دام - رادیولوژی دامپزشکی - کلینیکال پاتولوژی	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱- با حضور ترکیبات کتونی و بیلی روبین در ادرار کدام گزینه درست تر است؟
 - (۱) حضور بیلی روبین در ادرار به دلیل آستانه بالا در سگ ها پس از ایجاد زردی بالینی قابل تشخیص خواهد بود.
 - (۲) با توجه به امکان تجزیه هموگلوبین در کلیه سگ ها ممکن است این ترکیب در ادرار این حیوانات بدون مشکل کلیوی حضور داشته باشد.
 - (۳) با توجه به آستانه پایین کلیوی سگ ها ترکیبات کتونی مخصوص بتا هیدروکسی بوتیریک ممکن است در ادرار سگ های سالم نیز مشاهده شود.
 - (۴) حضور ترکیبات کتونی همراه با بیلی روبین معنی دار بوده و نشان دهنده لنفوم کلیوی خواهد بود.
- ۲- در مواردی که پس از اواربو هیستروکتومی حیوان دچار بی اختیاری ادراری شود تجویز کدام یک از ترکیبات می تواند مؤثر باشد؟
 - (۱) فنوکسی بنزامین
 - (۲) آزاتیوپرین
 - (۳) فنیل پروپانول آمین
 - (۴) دیازپام
- ۳- در نارسایی های حاد کلیوی:
 - (۱) تغییرات الکتروکاردیوگرافیک معمولاً زمانی ایجاد خواهند شد که مقدار پتاسیم از ۸ میل اکوی والان در لیتر بیشتر شود.
 - (۲) گلوکونات کلسیم به دلیل رسوب کلیوی در نارسایی های کلیوی حاد نباید تجویز شود.
 - (۳) با توجه به احتمال رسوب بی کریئات سدیم داخل وریدی از تجویز ملح پتاسیم به شکل زیر جلدی استفاده می شود.
 - (۴) در صورت وجود تاکی کاردی لازم است درمان با پتاسیم به میزان 1 mEq/l هر چه سریع تر انجام شود.
- ۴- در صورت تجویز خوراکی دیازپام در گربه ها چه عارضه جانبی ممکن است، رخ دهد؟
 - (۱) افت فشارخون و کلاپس
 - (۲) مسمومیت کلیوی
 - (۳) تشنج
 - (۴) نارسایی کبدی
- ۵- افزایش ولتاژ موج T در الکتروکاردیوگرام در اثر کدام اختلال می باشد؟
 - (۱) هیپرفسفاتمی
 - (۲) هیپرکالمی
 - (۳) هیپرکلسمی
 - (۴) هیپوکلسمی
- ۶- افزایش QT در الکتروکاردیوگرام نشان دهنده چه چیز می باشد؟
 - (۱) برادیکاردی
 - (۲) تاکی کاردی
 - (۳) بیماری WPW
 - (۴) Premature Atrial contraction
- ۷- کارکرد مدرهای تیازیدی کدام است؟
 - (۱) بر روی قوس هنله عمل می نماید.
 - (۲) از باز جذب سدیم در لوله های پروگزیمال جلوگیری می نماید.
 - (۳) بر روی سیستم انیدراز کربنیک عمل می نماید.
 - (۴) از باز جذب سدیم در لوله های پیچیده و دیستال جلوگیری می کند.

- ۸- بیماری WPW در الکتروکاردیوگرام دارای چه نشانه‌ای می‌باشد؟
 (۱) عدم وجود موج P
 (۲) افزایش مدت زمان P-R
 (۳) کاهش مدت زمان P-R
 (۴) وجود موج P بد شکل
- ۹- در کدام یک از بلوک‌های قلبی ارتباط منطقی بین امواج P و QRS وجود ندارد؟
 (۱) بلوک قلبی درجه II فرم ونک باخ فنومن
 (۲) بلوک قلبی درجه II تیپ B
 (۳) بلوک قلبی درجه III
 (۴) Sinus Arrest
- ۱۰- در کدام بیماری Diastolic Failure وجود دارد؟
 (۱) PDA
 (۲) کاردیومیوپاتی اتساعی
 (۳) کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک
 (۴) تترالوژی فالوت
- ۱۱- وراپامیل جزء کدام دسته از داروهای قلبی می‌باشد؟
 (۱) کلسیم بلوک‌ها
 (۲) بتابلوکرها
 (۳) سدیم بلوک‌ها
 (۴) مهارکننده پمپ سدیم پتاسیم
- ۱۲- افزایش بار حجم می‌تواند ناشی از چه چیزی باشد؟
 (۱) آمبولی ریوی
 (۲) هیپرتانسیون ریوی
 (۳) تنگی زیر دریچه آئورت
 (۴) پاره‌گی طناب وتری
- ۱۳- کدام دارو پیش بار را کاهش می‌دهد؟
 (۱) فوروزماید
 (۲) دیلتیازم
 (۳) پروپرانولول
 (۴) وراپامیل
- ۱۴- کدام دارو اینوتروپ مثبت و کاهنده تعداد ضربان قلب می‌باشد؟
 (۱) دوبوتامین
 (۲) دیگوکسین
 (۳) پروپرانولول
 (۴) دوپامین
- ۱۵- از دیژیتوکسین در چه مواردی استفاده می‌گردد؟
 (۱) نارسایی قلبی به همراه نارسایی سیستم خونساز
 (۲) نارسایی قلبی به همراه نارسایی کلیوی
 (۳) نارسایی قلبی به همراه نارسایی کبدی
 (۴) نارسایی قلبی به همراه نارسایی CNS
- ۱۶- در کدام بیماری افزایش بار فشار داریم؟
 (۱) آندوکاردیوزیس
 (۲) پاره‌شدگی طناب وتری
 (۳) کاردیومیوپاتی اتساعی
 (۴) بیماری کرم قلب
- ۱۷- خروج شیر از پستان و بزرگ‌شدگی پستان‌ها ناشی از کدام بیماری اندوکرینی است؟
 (۱) هیپرآدرنوکورتیسیسم
 (۲) دیابت بی‌مزه
 (۳) هیپوتیروئیدیسم
 (۴) دیابت
- ۱۸- پدیده سوموگی در چه مواردی ایجاد می‌شود؟
 (۱) دوز انسولین از مقدار مورد نیاز بیشتر باشد.
 (۲) بیماری‌های مقابله‌کننده با اثر انسولین وجود داشته باشد.
 (۳) افزایش حساسیت نسبت به تجویز داخل عضلانی انسولین وجود داشته باشد.
 (۴) در اکثر بیماران دیابتی هنگامی که میزان قند از $200 \frac{mg}{dl}$ افزایش پیدا کند.

۱۹- در صورت استفاده از کیت تشخیص آنتی ژن (Ag) بیماری کرم قلب، در چه صورتی جواب آزمایش منفی کاذب خواهد شد؟

(۱) حضور انگل جنس تر به تنهایی

(۲) تشکیل کمپلکس Ag - Ab

(۳) انجام آزمایش در زمان کمتر از ۶-۷ ماه از آلودگی اولیه

(۴) تمام موارد

۲۰- در مورد بیماری هرپس ویروس گربه ها (FHV - ۱) کدام جمله درست است؟

(۱) میزان مرگ و میر در این بیماری بسیار بالاست.

(۲) واکسن های موجود به طور کامل از این بیماری پیشگیری نمی کنند.

(۳) پس از بهبودی از بیماری به ندرت حالت ناقل مزمن دیده می شود.

(۴) مهم ترین نشانی بالینی این بیماری پیدایش زخم های نعل اسبی شکل در سطح پشتی - جلویی زبان است.

۲۱- در عفونت پاروو ویروسی سگ ها (CPV) بهترین زمان تست های تشخیصی آنتی ژن در مدفوع کدام است؟

(۱) سه روز اول است.

(۲) هفته دوم است.

(۳) فقط روز اول است.

(۴) روزهای اول و دوم و چهاردهم و پانزدهم است.

۲۲- در بیماری ویروسی نارسایی ایمنی گربه ها (FIV):

(۱) بیماری از راه واکسیناسیون قابل پیشگیری نیست.

(۲) میزان IgG سرم به علت تضعیف ایمنی هومورال کاهش شدید می یابد.

(۳) میزان شیوع عفونت با افزایش سن کاهش می یابد.

(۴) واکسیناسیون سالانه علیه سایر ویروس های دستگاه تنفس و گوارش با واکسن های کشته توصیه می شود.

۲۳- در عفونت لوسمی ویروسی گربه ها (FeLV) کدام گزینه درست است؟

(۱) ویروس در محیط برای طولانی مدت باقی می ماند.

(۲) در بیمارستان یا محل های نگهداری گربه ها احتمال انتقال افقی عفونت وجود دارد.

(۳) بیماری قابل پیشگیری از راه واکسیناسیون با واکسن های منحصراً زنده تخفیف حدت یافته است.

(۴) ویروس معمولاً از راه بزاق انتقال می یابد زیرا تراکم ویروس در بزاق بیش از خون است.

۲۴- کدام جمله در مورد لیشمانیاز احشایی سگ ها (CVL) درست است؟

(۱) علت اصلی مرگ معمولاً نارسایی کبدی است.

(۲) بهترین محل نمونه گیری معمولاً عقده های لنفاوی یا مغز استخوان است.

(۳) نوع دفاع اصلی میزبان معمولاً دفاع ایمنی هومورال با منشأ پادتن های راه IgG

(۴) سگ مبتلا به نشان های پوستی بعید است که ابتلای احشایی نیز داشته باشد.

۲۵- کدام آنزیم در سیکل مو نقش تحریک کننده دارد؟

(۱) ملاتونین

(۲) EGF - ۲

(۳) پرولاکتین

(۴) رتینوئید و کلسی تریول

۲۶- کدام دارو در درمان عفونت های مالاسزیایی مؤثر نیست؟

(۱) ایتواکونازول

(۲) کتوکونازول

(۳) گریزئوفلووین

(۴) تربینافین

۲۷- در لپتوسپیروز سگ‌ها کدام گزینه درست است؟

- (۱) زردی بیشتر در سگ‌های مبتلا به فرم مزمن دیده می‌شود.
- (۲) سرو واریته کانیکولا عموماً با نارسایی کلیوی همراه است.
- (۳) سرو واریته کانیکولا عموماً با نارسایی کبدی همراه است.
- (۴) بیشتر سگ‌های مبتلا دچار نوع حاد عفونت و نارسایی کلیوی می‌باشند.

۲۸- کدام جمله صحیح است؟

- (۱) فورونکولوز سگ‌ها از نوع عفونت‌های باکتریایی نیمه عمیق به‌شمار می‌رود.
- (۲) در فولیکولیت سگ‌ها احتمال رویش مجدد موها وجود دارد.
- (۳) فولیکولیت سگ‌ها از نوع عفونت‌های باکتریایی نیمه عمیق به‌شمار می‌رود.
- (۴) در فورونکولوز سگ‌ها احتمال رویش مجدد موها وجود دارد.

۲۹- در مورد جرب کدام جمله درست است؟

- (۱) مثبت بودن تست رفلکس خارش (scratch reflex) در سگ‌های مبتلا به جرب سارکوپتس حاکی از قطعیت تشخیص حتی بدون مشاهده هرگونه جرب می‌باشد.
- (۲) جرب notoedres cati قابلیت سرایت چندانی به سایر گربه‌ها ندارد.
- (۳) جرب sarcoptes scabiei بیشتر به قسمت‌های پر موی سگ‌های مبتلا حمله می‌کند.
- (۴) جرب demodex cains بیشتر به قسمت‌های پر موی سگ‌های مبتلا حمله می‌کند.

۳۰- برای درمان درماتیت‌های باکتریال بهترین آنتی‌بیوتیک کدام است؟

- (۱) سفالوسپورین‌ها
- (۲) پنی‌سیلین‌ها
- (۳) ماکرولیدها
- (۴) آمینوگلیکوزیدها

۳۱- در اوتیت‌های میانی:

- (۱) تنها مواردی جراحی می‌شوند که دچار نیست‌آگموس شده باشند.
- (۲) در صورت پاره بودن پرده صماخ جهت تأثیر بهتر از آمینوگلیکوزیدها استفاده می‌شود.
- (۳) ابتدا به مدت ۴ هفته از آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف به‌همراه مقادیر ضد التهابی گلوکوکورتیکوئیدها استفاده می‌شود.
- (۴) پس از انجام برش روی پرده صماخ Myringotomy ترکیبات آنتی‌بیوتیکی و گلوکوکورتیکوئیدها به گوش میانی تزریق خواهند شد.

۳۲- کدام عبارت در مورد مصرف آب در خرگوش صحیح نیست؟

- (۱) میزان مصرف آب حدود ۵-۴ درصد وزن بدن در روز می‌باشد.
- (۲) باید از اضافه کردن دارو و یا ویتامین داخل آب پرهیز کرد.
- (۳) خرگوش‌ها در مقایسه با سایر حیوانات خانگی نیاز به مصرف آب بیشتری دارند.
- (۴) استفاده از ظروف آب سر باز در جایگاه، ممکن است سبب بروز درماتیت مرطوب شود.

۳۳- کدام عبارت در مورد خصوصیات بیولوژیک هامستر صحیح نیست؟

- (۱) مقدار مصرف غذای روزانه حدود ۱۰۰ گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن است.
- (۲) غدد تنه‌ای (Flank glands) در نرها بزرگتر بوده و در فصول تولیدمثل فعال‌تر هستند.
- (۳) طول عمر متوسط هامستر حدود ۲-۱/۵ سال است.
- (۴) درجه حرارت طبیعی بدن ۳۹/۵-۳۸/۵ درجه سانتی‌گراد است.

- ۳۴- کدام یک از عبارات زیر در مورد ملاحظات نگهداری از هامستر صحیح است؟
- (۱) دست کم پروتئین جیره در حد ۵-۴ درصد حفظ شود.
 - (۲) رطوبت مناسب جایگاه بین ۷۵-۶۰ درصد باید همواره تأمین شود.
 - (۳) تغذیه نوزادان از حدود ۳ هفتگی با مصرف سبزیجات تازه آغاز می شود.
 - (۴) مصرف جیره های حاوی دانه های روغنی می تواند سبب بروز عوارض ناشی از کمبود ویتامین D شود.
- ۳۵- کدام یک از عبارات زیر در مورد اطلاعات تولیدمثلی خرگوش صحیح نیست؟
- (۱) طول دوره شیرخواری حدود ۶-۴ هفته است.
 - (۲) تشخیص آبستنی طی ۱۲-۱۰ روز اول از طریق ملاسمه محوطه بطنی امکان پذیر است.
 - (۳) تخمک گذاری به صورت القایی است و حدود ۱۰ ساعت پس از جفتگیری رخ می دهد.
 - (۴) در سیکل فحلی پروستروس، استروس و متاستروس ۲ روز و دی استروس ۱۴-۱۲ روز به طول می انجامد.
- ۳۶- کدام عبارت در مورد انگل های گوارشی در هامستر درست است؟
- (۱) *Hymenolepis nana* دارای سیکل تکاملی مستقیم و غیرمستقیم است.
 - (۲) درمان انتخابی برای سستودهای گوارشی Ivermectin است.
 - (۳) متداولترین نماتود جدا شده از همسترها *Hymenolepis sp* است.
 - (۴) آلودگی به نماتود *Syphacia Obvelata* از نظر بیماری های زئونوز و بهداشت عمومی دارای اهمیت است.
- ۳۷- کدام عبارت در رابطه با عوارض پوستی در هامستر صحیح نمی باشد؟
- (۱) با نمونه برداری سطحی از اپیدرم نمی توان *Demodex aurati* را جدا و مشاهده نمود.
 - (۲) ضایعات حاصل از دمودیکوز معمولاً خارش دار و بدون پوسته ریزی است.
 - (۳) بستر حاوی مواد خشن از مهم ترین علل بروز Bedding Associated Dermatitis است.
 - (۴) *Staphylococcus aureus* متداول ترین عامل باکتریایی جدا شده از آبسه های پوستی است.
- ۳۸- کدام عبارت در مورد انتروکولیت ناشی از مصرف آنتی بیوتیک صحیح نیست؟
- (۱) بیماری به دلیل افزایش جمعیت و توکسین باکتری های گرم منفی خصوصاً از نوع *Clostridium difficile* رخ می دهد.
 - (۲) مصرف مکمل های حاوی لاکتوباسیل در درمان بیماری مفید خواهد بود.
 - (۳) بیماری خصوصاً متعاقب مصرف آنتی بیوتیک های مؤثر بر باکتری های گرم مثبت ایجاد می شود.
 - (۴) تغییر ناگهانی جیره و مصرف جیره غنی از کربوهیدرات از علل اولیه بروز بیماری است.
- ۳۹- کدام عبارت در مورد تغذیه هامستر صحیح نیست؟
- (۱) میزان چربی جیره باید حدود ۵-۴ درصد باشد.
 - (۲) میزان پروتئین جیره باید حدود ۱۶٪ باشد.
 - (۳) مصرف جیره های حاوی انواع دانه های روغنی سبب بروز هیپوویتامینوز D می شود.
 - (۴) مقدار مصرف غذای خشک در یک هامستر بالغ حدود ۲۰-۱۵ گرم در یک روز می باشد.
- ۴۰- سگ نر هفت ساله نگهبان با علائم لنگش پیشرونده که از یک ماه پیش آغاز شده به درمانگاه ارجاع شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟
- (۱) مسمومیت با ارگانوفسفره
 - (۲) ترومای ستون مهره
 - (۳) اختلالات حس عمقی
 - (۴) دژنراسیون قطعات نخاعی

- ۴۱- در بیماری که مبتلا به نیستاکموس بوده است کشکک زانوی آن نیز درجه سه است کدام تشخیص محتمل تر است؟
 (۱) قطع نخاع از قسمت بالاتر از L۴
 (۲) ضایعات سیستم و ستیبولار و اکستراپیر آمیدال
 (۳) ادم ناشی از ترومای بصل النخاع
 (۴) توده فضاگیر در تنه مغزی
- ۴۲- عوامل مؤثر در کاهش هوشیاری اغلب بر کدام ناحیه تأثیر می گذارند؟
 (۱) سیستم مشبک صعودی
 (۲) تالاموس
 (۳) هیپوتالاموس
 (۴) قشر خاکستری مغز
- ۴۳- لوچی داخل (مدیال) بیشتر به چه علت اتفاق می افتد؟
 (۱) فلج عصب زوج ششم
 (۲) فلج عصب زوج سوم
 (۳) اسپاسم عضله مستقیم داخلی چشم
 (۴) اسپاسم عضله مستقیم خارجی چشم
- ۴۴- کدام روش برای تعیین زمان مناسب جفت گیری در سگ کاربرد ندارد؟
 (۱) آندوسکوپی واژن
 (۲) سنجش میزان استروژن سرم
 (۳) ارزیابی ترشحات (cervovaginal)
 (۴) سنجش میزان پروژسترون سرم
- ۴۵- میزان کورتیزول خون در کدام یک از مراحل آبستنی بالا می رود؟
 (۱) در اواسط آبستنی
 (۲) در ابتدای آبستنی
 (۳) در انتهای آبستنی
 (۴) در ابتدا و اواسط آبستنی
- ۴۶- درمان انتخابی عفونت حاد باکتریایی پروستات چیست؟
 (۱) استفاده از داروی مژسترون
 (۲) استفاده از داروی فناستریول
 (۳) اخته کردن حیوان
 (۴) آنتی بیوتیک تراپی
- ۴۷- در خصوص سنگ های ادراری کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
 (۱) به منظور جلوگیری از ایجاد سنگ های اوراته می توان از جیره فاقد پروتئین و همینطور سیترات پتاسیم استفاده کرد.
 (۲) عوامل باکتریایی استافیلوکوکی در ایجاد سنگ های استروویتی گربه ها بیشترین فراوانی را داشته اند.
 (۳) سنگ های اگزالاتی در سگ ها معمولاً از ملح دی هیدرات اگسالات کلسیم (ودلیت) تشکیل شده اند که در ادرار اسیدی احتمال تشکیل آنها بیشتر است.
 (۴) سنگ های سیستینی معمولاً در ادرار قلیایی تشکیل می شوند و به منظور انحلال آنها می توان از دی پنیسیلین استفاده کرد.
- ۴۸- هیدروکلروتیازید و آلوپورینول به ترتیب در درمان کدام سنگ ادراری به کار می روند؟
 (۱) اورات - اگزالات
 (۲) استروویت - اگزالات
 (۳) اگزالات - اورات
 (۴) اگزالات - استروویت
- ۴۹- کلیرانس سهمی سدیم در کدام عارضه کمتر است؟
 (۱) آزوتمی پیش کلیوی
 (۲) آزوتمی کلیوی
 (۳) گلو مرونفریت اتوایمیون
 (۴) اسیدوز توبولی
- ۵۰- کدام مورد مشخصه نارسایی های حاد پیش کلیوی است؟
 (۱) رسوب ادراری فعال
 (۲) ایزوستنوری همراه با آنمی
 (۳) آزوتمی همراه با افزایش وزن مخصوص ادرار
 (۴) افزایش فشارخون در نارسایی های حاد پیش کلیوی شدیدتر است.

۵۱- در خصوص درمان آنتی بیوتیکی به صورت پیشگیری در عفونت های دستگاه ادراری کدام جمله درست است؟

- (۱) این نوع درمان در عفونت های ناشی از باکتری های میله ای استفاده می شود.
- (۲) در عفونت غیر پیچیده استفاده از روش پیشگیری باعث ریشه کنی کامل ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری خواهد شد.
- (۳) در عفونت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که بیش از سه بار در طول یک سال تکرار شود.
- (۴) در این نوع از درمان های عفونت های دستگاه ادراری آنتی بیوتیک ها با دوز ۲ برابر غلظت ادراری تجویز می شوند.

۵۲- پارگی قرنیه به همراه بیرون زدن عنبیه و تشکیل بافت فیبروزی روی آن را چه می نامند؟

- (۱) Hyphema (۲) Staphiloma (۳) Iris Prolapse (۴) Keratoconus

۵۳- کدام بیماری ناشی از انسداد غده میبومین چشم است؟

- (۱) Hordeolum (۲) Entropion (۳) Cherry Eye (۴) Chalazion

۵۴- Persistent Pupillary Membrane منجر به شروع ایجاد کاتاراکت در کدام قسمت عدسی می شود؟

- (۱) مرکزی (۲) استوایی (۳) خلفی (۴) قدامی

۵۵- در مورد بی کفایتی بخش برون ریز پانکراس (EPI) کدام گزینه صحیح نیست؟

- (۱) کاهش شدید آنزیم های پانکراس همیشه با علائم بالینی همراه است.
- (۲) معمول ترین عامل ایجاد کننده آن اتروپی سلول های آسینی و پانکراتیت مزمن است.
- (۳) معمول ترین علامت بالینی این بیماری کاهش وزن و مدفوع شل است.
- (۴) دقیق ترین روش تشخیص EPI در سگ ها اندازه گیری CTI.I است.

۵۶- واحد عملکردی روده باریک کدام است؟

- (۱) گابلت سل (۲) ویلوس (۳) ویلوس - کریپت (۴) لبه مسواکی

۵۷- تشخیص Food allergy بر اساس کدام مورد است؟

- (۱) بیوپسی از روده ها
- (۲) پاسخ به کورتون درمانی
- (۳) پاسخ به تغییر جیره و Food trial
- (۴) مشاهده علائم پوستی و تاریخچه

۵۸- کدام بیماری در لیست تشخیص تفریقی (EPI) Exocrine Parcreatic Insufficiency قرار نمی گیرد؟

- (۱) IBD (۲) Parvovirus (۳) Idiopathic ARD (۴) Partial intestinal obstruction

۵۹- معمول ترین بدخیمی دستگاه گوارش گربه کدام است؟

- (۱) لیومیوما
- (۲) لنفوسارکوم
- (۳) آدنوکارسینوم
- (۴) کارسینومای سلول های سنگفرشی

۶۰- در مورد بیماری SIBO کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) بیشتر در نژادهای کوچک به ویژه تریرها دیده می شود.
- (۲) رقابت در جذب مواد مغذی توسط باکتری ها رخ می دهد.
- (۳) در این بیماری غشاء لبه مسواکی روده ها تخریب می شود.
- (۴) ظهور برخی متابولیت های باکتریایی در پاتوژنز بیماری مؤثر است.

۶۱- کدام یک از سلول های زیر به ترتیب وظیفه ترشح گاسترین و تحریک ترشح اسید معده را برعهده دارند؟

- (۱) Parietal cell و G-cell (۲) G-cell و G-cell (۳) Chief cell و Parietal cell (۴) G-cell و Parietal cell

- ۶۲- در درمان کدام بیماری **Sueralfate** به کار می‌رود؟
 (۱) ازوفازیت (۲) انسداد پیلور
 (۳) سندرم روده تحریک‌پذیر (۴) Gastric Dilatation and Volvolus
- ۶۳- در مواردی که زخم معده ناشی از مصرف زیاد داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی باشد، چه درمانی را پیشنهاد می‌کنید؟
 (۱) Dobutamine (۲) Corticosteroid (۳) Misoprostol (۴) Metoclopramide
- ۶۴- اسهال چرب ناشی از فعالیت کدام انگل است؟
 (۱) ژیاودیلا (۲) کریپتوسپوریديوم (۳) توکسوپلاسما (۴) همه موارد
- ۶۵- کدام یک از دندان‌ها در سگ سه ریشه‌ای است؟
 (۱) PM1 (۲) Incisors (۳) PM4 فک بالا (۴) Canine
- ۶۶- کدام گزینه دندان‌های **Carnisial** در سگ‌ها را نشان می‌دهد؟
 (۱) ۴۰۸, ۳۰۸, ۲۰۸, ۱۰۸ (۲) ۴۰۹, ۳۰۹, ۲۰۸, ۱۰۸
 (۳) ۴۰۸, ۳۰۸, ۲۰۷, ۱۰۷ (۴) ۴۰۶, ۳۰۶, ۲۰۵, ۱۰۵
- ۶۷- تشخیص کدام بیماری تنها براساس تاریخچه امکان‌پذیر است؟
 (۱) Gastric erosion / ulcer (۲) Delayed gastric emptying
 (۳) Bilious vomiting syndrome (۴) Gastric outlet obstruction
- ۶۸- کدام گزینه در مورد زخم معده نادرست است؟
 (۱) رخداد آن در گربه بیشتر از سگ است.
 (۲) در سگ‌های مبتلا به آدنوکارسینوم معده محتمل است.
 (۳) مصرف داروهای NSAID می‌تواند عامل آن باشد.
 (۴) عوامل ایجادکننده گاستریت حاد و مزمن می‌توانند سبب آن باشند.
- ۶۹- کدام مورد باعث ایجاد اسهال اسمزی می‌شود؟
 (۱) التهاب روده (۲) سموم شیمیایی
 (۳) توکسین باکتری‌ها (۴) تغییر ناگهانی جیره غذایی
- ۷۰- **Praying Position** و **Non Producing Retching** از علایم بالینی کدام بیماری گوارشی است؟
 (۱) GUE, GDV (۲) Panleukopnea, GDV
 (۳) GDV, Panleukopnea (۴) GDV (Gastric Dilatation & Volvolus), GUE (Gastric Ulcer & Erosion)
- ۷۱- صدای کدام یک از دریچه‌های قلبی از سمت راست قفسه سینه بهتر شنیده می‌شود؟
 (۱) آئورتیک (۲) ریوی (۳) میترال (۴) سه‌لتی
- ۷۲- رفلکس‌های حالتی و وضعیتی سلامت یا بیماری کدام حس را بررسی می‌کند؟
 (۱) راه‌های هرمی (۲) حس عمقی (۳) حس تعادل (۴) اعصاب مغزی
- ۷۳- یک سگ ۸ کیلوگرمی که به علت اسهال و استفراغ دچار ۵٪ کم آبی بدن است و ظرف شبانه‌روز گذشته حدوداً ۱۵۰ سی‌سی مایعات دفع کرده است در شبانه‌روز آینده چه مقدار مایعات نیاز خواهد داشت؟
 (۱) ۱۴۵۰ سی‌سی (۲) ۵۰۰ سی‌سی (۳) ۹۵۰ سی‌سی (۴) ۲۵۰ سی‌سی

- ۷۴- کدام گزینه بیشتر با علائم حضور انگل اتودکتس همخوانی دارد؟
 (۱) ترشحات سفت - سیاه رنگ
 (۲) ترشحات خامه‌ای - سبز رنگ
 (۳) ترشحات آبکی - زرد رنگ
 (۴) ترشحات چسبیده - روشن
- ۷۵- کدام نشانه در معاینه ته چشم معرف افزایش فشار مایع مغزی نخاعی است؟
 (۱) کاهش عروق شبکیه
 (۲) برآمدگی دیسک اپتیک
 (۳) جداشدن شبکیه
 (۴) آتروفی رتین
- ۷۶- رفلکس نخاعی درجه ۳ نشانه چیست؟
 (۱) نشانه طبیعی بودن رفلکس
 (۲) اختلالات نرون‌های حرکتی پائینی
 (۳) ضایعات نرون‌های حرکتی بالایی
 (۴) ضایعات اکستراپیرامیدال
- ۷۷- در یک سگ تریر سه ساله که به میزان ۸٪ کم آب است و امکان گرفتن رگ از آن نیست، چه روشی برای تجویز سرم مناسب‌تر است؟
 (۱) خوراکی و زیرجلدی
 (۲) داخل صفاقی و خوراکی
 (۳) زیرجلدی و داخل صفاقی
 (۴) داخل استخوانی و داخل صفاقی
- ۷۸- کدام یک از موارد زیر از شاخصی‌های الکتروکاردیوگرام بزرگ شوکی بطن چپ در سگ نیست؟
 (۱) ارتفاع موج R در لید ۱ بیشتر از ۳ میلی‌ولت
 (۲) پهنای کمپلکس‌های QRS بیشتر از ۶/۰ ثانیه
 (۳) ارتفاع موج R از جمع اشتقاق‌های ۱ و aVF بیشتر از ۴ میلی‌ولت
 (۴) ارتفاع موج R در لید II یا aVF بیشتر از ۳ میلی‌ولت
- ۷۹- کدام یک از موارد زیر نشان‌دهنده کاهش ترشح اشک است؟
 (۱) زیر ۹ میلی‌متر در دقیقه
 (۲) زیر ۹ میلی‌متر در ۵ دقیقه
 (۳) زیر ۵ میلی‌متر در دقیقه
 (۴) زیر ۵ میلی‌متر در ۵ دقیقه
- ۸۰- کدام یک از موارد زیر از درماتوزهای موجود در سگ‌های مبتلا به لیشمانیوز نیست؟
 (۱) پاپولار
 (۲) وزیکولار
 (۳) اولسراتیو
 (۴) ندولار
- ۸۱- در صورت دیدن ظاهری شبیه به مقطع میوه کیوی در تصاویر اولتراسونوگرافی کیسه صفرا به کدام عارضه مشکوک می‌شوید؟
 (۱) موکوسل
 (۲) سنگ کیسه صفرا
 (۳) التهاب دیواره کیسه صفرا
 (۴) انسداد مجاری صفراوی
- ۸۲- در رادیوگرافی از سگ مبتلا به بروسلوز کدام نشانه دیده می‌شود؟
 (۱) بزرگ‌شدگی کلیه‌ها
 (۲) پنومونی بین‌بافتی
 (۳) بزرگ‌شدگی قلب راست
 (۴) دیسکواسپاندیلیت
- ۸۳- بهترین راه تشخیص کلاپس نای چیست؟
 (۱) فلوروسکوپی
 (۲) رادیوگرافی در انتهای بازدم
 (۳) کلاپس نای در نکرپسی تشخیص داده می‌شود.
 (۴) رادیوگرافی در انتهای دم
- ۸۴- برای تشخیص کدام سنگ در مثانه، نیاز به رادیوگرافی با ماده حاجب مثبت است؟
 (۱) اگسلات
 (۲) سیستین
 (۳) فسفات
 (۴) سیلیکا

۸۵- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده بزرگ شدگی قلب در رادیولوژی است؟

(۱) افزایش دانسیته قلب

(۲) افزایش فاصله قلب با دیافراگم

(۳) افزایش فاصله قلب با جناغ سینه در نمای جانبی

(۴) بالا رفتن محل دو شاخه شدن نای در نمای جانبی

۸۶- کدام یک از نئوپلاسم‌های لنفوئیدی تنها با منشاء سلول B است؟

(۱) chronic lymphocytic leukemia (۲) Lymphoblastic lymphoma

(۳) prolymphocytic lymphoma (۴) mantle cell lymphoma

۸۷- کدام یک از کست‌ها در ادرار نشان دهنده استاز جریان توبولی است؟

(۱) مومی (۲) گرانولار (۳) گلومرولی (۴) سلولار

۸۸- به منظور تفریق هیپرگلیسمی ناشی از استرس در گربه‌ها کدام روش استفاده می‌شود؟

(۱) اندازه‌گیری گلوکز خون (۲) اندازه‌گیری گلوکز ادرار

(۳) اندازه‌گیری فروکتوز آمین (۴) اندازه‌گیری هموگلوبین آریتروسیت‌ها

۸۹- کدام یک از موارد زیر از یافته‌های آزمایشگاهی دیابت ملیتوس نیست؟

(۱) هیپواسمولاریتی (۲) الکالوز متابولیک (۳) افزایش شکاف آنیونی (۴) پروتئینوری

۹۰- شایع‌ترین یاخته لوکوگرام استوس کدام است؟

(۱) نوتروفیلی (۲) لوکوسیتوز (۳) مونوسیتوز (۴) لنفوپنی



۱۱. به اطلاع می‌رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 1399/05/14 با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون دکتری سال 1399" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک	E	1	دامپزشکی

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
2	61	3	31	2	1
1	62	1	32	3	2
3	63	4	33	1	3
1	64	4	34	4	4
3	65	4	35	2	5
2	66	1	36	1	6
3	67	2	37	4	7
1	68	4	38	3	8
4	69	4	39	3	9
4	70	4	40	3	10
4	71	2	41	1	11
2	72	2	42	4	12
3	73	1	43	1	13
1	74	2	44	2	14
2	75	3	45	2	15
3	76	4	46	4	16
4	77	1	47	3	17
1	78	3	48	1	18
1	79	1	49	4	19
2	80	3	50	2	20
1	81	3	51	1	21
4	82	2	52	4	22
3	83	4	53	4	23
2	84	3	54	2	24
4	85	1	55	1	25
4	86	3	56	3	26
1	87	3	57	2	27
3	88	2	58	2	28
2	89	2	59	4	29
4	90	1	60	1	30